

高齢者のワクチン医師用虎の巻/全て

疾患	ワクチン名	製品名	用量	用法	高齢者 定期接種	対象年齢 RSウイルスに関しては 接種適応年齢	メーカー	備考
インフルエンザ	インフルエンザHAワクチン	インフルエンザHAワクチン、フルーピック	0.5mL	皮下注	○	・65歳以上 ・60～64歳で心臓、腎臓、呼吸器等に障害…	ビケン/田辺三菱、KMバイオ/明治製菓、デンカ生研/アステラス、第一三共	
	高用量インフルエンザHA	エフェルダ	0.7mL	筋注	×		サノフィ	発売延期
新型コロナウイルス感染症	コロナウイルスRNAワクチン	コミナティ筋注	0.3mL	筋注	○	・65歳以上 ・60～64歳で心臓、腎臓、呼吸器等に障害…	ファイザー	
		スパイクバックス	0.5mL	筋注	○		モデルナ	
		ダイチロナ	0.6mL	筋注	○		第一三共	
		コスタイベ	生食10mLにて溶解し、1回0.5mL使用	筋注	○		明治製菓	レプリコンワクチン
	組換えコロナウイルスワクチン	ヌバキンビット	0.5mL	筋注	○		武田	
		コブゴーズ			検討中		塩野義	
肺炎球菌	23価肺炎球菌莢膜多糖体ワクチン(PPSV23)	ニューモバックスNP	0.5mL	筋注 または 皮下注	○	・65歳を迎える方 ・60～64歳で一定の基礎疾患がある方	MSD	肺炎球菌には90種類以上の血清型があり、定期接種で使用される「ニューモバックスNP（23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン）」は、そのうちの23種類の血清型に効果があります。この23種類の血清型は成人の侵襲性肺炎球菌感染症の原因の約4-5割を占め、「ニューモバックスNP」はこの23種類の血清型の侵襲性肺炎球菌感染症を4割程度予防する効果があります。定期接種ではまずこのワクチンを接種しましょう。65歳の誕生日前日～66歳の誕生日前日までが対象者です。
	20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)	プレバナー20	0.5mL	筋注	検討中		ファイザー	高齢者の定期接種ではありませんが、ニューモバックスNP接種済みの方は1～4年以降にさらに接種することが可能です。
	15価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV15)	バクニュバンス	0.5mL	筋注	×		MSD	

高齢者のワクチン医師用虎の巻/全て

疾患	ワクチン名	製品名	用量	用法	高齢者 定期接種	対象年齢 RSウイルスに関しては 接種適応年齢	メーカー	備考
带状疱疹	組換え带状疱疹ワクチン	シングリックス	0.5mL	筋注	○	・65歳を迎える方 ・60~64歳で一定の基礎疾患がある方 ・5年間の経過措置あり ※	GSK	带状疱疹は、過去に水痘（水ぼうそう）にかかった時に体の中に潜伏した水痘带状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱（水ぶくれ）が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「带状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。 带状疱疹のワクチンは水痘生ワクチンよりもシングリックスの方が、带状疱疹予防効果が高いことは明らかではありますが、接種費用と回数はシングリックスのほうが負担が大きいです。 2か月以上の間隔をあけて2回筋肉内に接種します。6か月後までに2回目を接種すること
	弱毒性水痘ワクチン	乾燥弱毒生水痘ワクチン	添付の溶剤0.7mLで溶解し、0.5mL使用	皮下注	○		阪大微研	接種禁忌：明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する者及び免疫抑制をきたす治療を受けている者に接種してはならない。副腎皮質ステロイド剤（プレドニゾロン等）免疫抑制剤（シクロスポリン サンディミュン タクロリムス プログラフ）使用中の場合は、本生ワクチン接種により、播種性の症状を呈するなどワクチンウイルスの感染を増強させるおそれがあるので接種しないこと。
RSウイルス感染症	組換えRSウイルスワクチン	アレックスビー	専用溶解溶液全量で溶解し、0.5mL使用	筋注	検討中	60歳以上	GSK	
	組換えRSウイルスワクチン	アブリスボ	専用溶解溶液全量で溶解し、0.5mL使用	筋注	検討中	・60歳以上 ・妊婦	ファイザー	60歳以上だけでなく、妊婦28-36Wに接種することが望ましい

※2025年度から2029年度までの5年間の経過措置として、その年度内に70、75、80、85、90、95、100歳となる方も接種対象、100歳以上の方については2025年度に限り全員対象となる

高齢者のワクチン医師用虎の巻/インフル・コロナ

疾患	ワクチン名	製品名	用量	用法	高齢者 定期接種	対象年齢	メーカー	備考
インフルエンザ	インフルエンザHAワクチン	インフルエンザHAワクチン、フルービック	0.5mL	皮下注	○	・ 6 5 歳以上 ・ 6 0 ～ 6 4 歳 で心臓、腎臓、呼吸器等に障害 …	ビケン/田辺三菱、KMバイオ/明治製菓、デシカ生研/アステラス、第一三共	
	高用量インフルエンザHA	エフエルダ [®]	0.7mL	筋注	×		サノフィ	発売延期
新型コロナウイルス感染症	コロナウイルスRNAワクチン	コミナティ筋注	0.3mL	筋注	○	・ 6 5 歳以上 ・ 6 0 ～ 6 4 歳 で心臓、腎臓、呼吸器等に障害 …	ファイザー	
		スパイクバックス	0.5mL	筋注	○		モデルナ	
		ダイチロナ	0.6mL	筋注	○		第一三共	
		コスタイベ	生食10mLにて溶解し、1回0.5mL使用	筋注	○		明治製菓	レプリコンワクチン
	組換えコロナウイルスワクチン	ヌバキソビット	0.5mL	筋注	○		武田	
		コブゴーズ			検討中		塩野義	

高齢者のワクチン医師用虎の巻/肺炎球菌・带状疱疹

疾患	ワクチン名	製品名	用量	用法	高齢者 定期接種	対象年齢	メーカー	備考
肺炎球菌	23価肺炎球菌莢膜多糖体ワクチン (PPSV23)	ニューモバックス NP	0.5mL	筋注 または 皮下注	○	・ 65歳を迎える方 ・ 60~64歳で一定の基礎 疾患がある方	MSD	肺炎球菌には90種類以上の血清型があり、定期接種で使用される「ニューモバックスNP（23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン）」は、そのうちの23種類の血清型に効果があります。この23種類の血清型は成人の侵襲性肺炎球菌感染症の原因の約4-5割を占め、「ニューモバックスNP」はこの23種類の血清型の侵襲性肺炎球菌感染症を4割程度予防する効果があります。定期接種ではまずこのワクチンを接種しましょう。65歳の誕生日前日～66歳の誕生日前日までが対象者です。
	20価肺炎球菌結合型 ワクチン(PCV20)	プレベナー20	0.5mL	筋注	検討中		ファイザー	高齢者の定期接種ではありませんが、ニューモバックスNP接種済みの方は1～4年以降にさらに接種することが可能です。
	15価肺炎球菌結合型 ワクチン(PCV15)	バクニュバンス	0.5mL	筋注	×		MSD	
带状疱疹	組換え带状疱疹ワクチン	シングリックス	0.5mL	筋注	○	・ 65歳を迎える方 ・ 60~64歳で一定の基礎 疾患がある方 ・ 5年間の経過措置あり ※	GSK	带状疱疹は、過去に水痘（水ぼうそう）にかかった時に体の中に潜伏した水痘带状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱（水ぶくれ）が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「带状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。 带状疱疹のワクチンは水痘生ワクチンよりもシングリックスの方が、带状疱疹予防効果が高いことは明らかではありますが、接種費用と回数はシングリックスのほう負担が大きいです。 2か月以上の間隔をあけて2回筋肉内に接種します。6か月後までに2回目を接種すること
	弱毒性水痘ワクチン	乾燥弱毒生水痘ワクチン	添付の溶剤0.7mLで 溶解し、0.5mL使用	皮下注	○		阪大微研	接種禁忌：明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する者及び免疫抑制をきたす治療を受けている者に接種してはならない。副腎皮質ステロイド剤（プレドニゾロン等）免疫抑制剤（シクロスポリン サンディミュン タクロリムス プログラフ）使用中の場合は、本生ワクチン接種により、播種性の症状を呈するなどワクチンウイルスの感染を増強させるおそれがあるので接種しないこと。

※2025年度から2029年度までの5年間の経過措置として、その年度内に70、75、80、85、90、95、100歳となる方も接種対象、100歳以上の方については2025年度に限り全員対象となる

高齢者のワクチン医師用虎の巻/RSウイルス

疾患	ワクチン名	製品名	用量	用法	高齢者 定期接種	接種適応年齢	メーカー	備考
RSウイルス感染症	組換えRSウイルスワクチン	アレックスビー	専用溶解溶液全量で溶解し、0.5mL使用	筋注	検討中	60歳以上	GSK	
	組換えRSウイルスワクチン	アプリスボ	専用溶解溶液全量で溶解し、0.5mL使用	筋注	検討中	・ 60歳以上 ・ 妊婦	ファイザー	60歳以上だけでなく、妊婦28-36Wに接種することが望ましい